



**CARACTERÍSTICAS CLÍNICO - EPIDEMIOLÓGICAS EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS CON DERMATITIS ATÓPICA ATENDIDOS EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, LIMA, EN EL PERIODO DEL 2021**

Autores principales

Arias Orellana, Daya Lucero¹

Corbacho Cordero, Camilla Fernanda¹

Autores secundarios

Jorge Alonso García Mostajo²

Rosalía Angélica Ballona Chambergo²

Filiaciones institucionales:

1 Facultad de Medicina Humana, Universidad de San Martín de Porres, Lima.

2 Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, Lima

Conflictos de interés: Niega conflictos de interés.

Correspondencia: Camilla Fernanda Corbacho Cordero, Avenida Alfredo Benavides 1480 dpto. 4A, Miraflores; camillacorbachocordero@gmail.com ; 964868913

Ciudad, país, año: Lima, Perú, 2024

RESUMEN

Objetivo: Determinar las características clínico – epidemiológicas de la dermatitis atópica en pacientes menores de 15 años del servicio de Dermatología del Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima, durante el periodo 2021.

Metodología: Estudio de tipo descriptivo transversal. La población fueron pacientes pediátricos con una edad entre los 28 días de nacidos a los 15 años atendidos en consulta externa del departamento de dermatología que estén diagnosticados con dermatitis atópica en el periodo 2021.

Resultados: De los 162 pacientes evaluados, la edad promedio fue de 5.1 años, el 52.47% fueron del sexo masculino y de los cuales el 33,33% provenían de los distritos Lima Centro. Asimismo, sobre el tiempo de enfermedad, se tuvo que el 69,32% fue de estadio crónico y que en primavera tenían una mayor atención (33,68%). El 70,71% no tenía antecedentes de atopia y el 79,35% no tuvo antecedentes familiares asociado, además el 56,99% presentaban prurito y alteración de sueño, el 86,96% no presento hiperreactividad bronquial, pero el 75% tuvo lesiones cutáneas.

Conclusión: En el presente estudio se concluyó que la mayor proporción de pacientes con la patología de dermatitis atópica fueron de género masculino. Las manifestaciones principales encontradas fueron prurito con alteración del sueño, liquenificación y lesiones cutáneas que respetan el límite de pliegue. La frecuencia de casos fue mayor durante el primavera y verano. Por último, la mayor parte de la población pediátrica con dermatitis atópica atendida en el INSN-Breña procedían de Lima Centro y presentaba un tiempo de enfermedad crónico.

Palabras clave: Dermatitis Atópica, Lesiones cutáneas, reacción inflamatoria crónica (fuente: DeCS).

ASBTRACT

Objective: Determine the clinical-epidemiological characteristics of atopic dermatitis in patients under 15 years of age from the Dermatology service of the National Institute of Children's Health, Lima, during the period 2021.

Methodology: Cross-sectional descriptive study. The population was pediatric patients with an age between 28 days of birth and 15 years of age seen in the outpatient clinic of the dermatology department who were diagnosed with atopic dermatitis in the period 2021.

Results: Of the 162 patients evaluated, the average age was 5.1 years, 52.47% were male and of which 33.33% came from the Lima Center districts. Likewise, regarding the time of illness, it was found that 69.32% were in the chronic stage and that in spring they had greater attention (33.68%). 70.71% had no history of atopy and 79.35% had no associated family history, in addition 56.99% had itching and sleep disturbance, 86.96% did not present bronchial hyperreactivity, but 75% had skin lesions.

Conclusion: In the present study it was concluded that the highest proportion of patients with atopic dermatitis pathology were male. The main manifestations found were pruritus with sleep disturbance, lichenification and skin lesions that respect the fold limit. The frequency of cases was higher during spring and summer. Finally, most of the pediatric population with atopic dermatitis treated at the INSN-Breña came from Lima Center and had a chronic illness period.

Key words: Atopic dermatitis, Skin lesions, Chronic inflammatory disease (Source: DeCS).