

Paracoccidioidomicosis con manifestaciones digestivas y adenopatías en un paciente pediátrico diagnosticado con tuberculosis ganglionar.

Autores

Raul A. Navarro-Rosemberg^{1,a, b}, Roberto E. Rojas-Leon^{2,a,d}, María del Carmen Quispe-manco^{2,a}, James Garcia-villanueva^{3,c}.

Filiación

¹Médico Patólogo Clínico.

²Tecnólogo Médico

³ Médico residente de Patología Clínica.

^a Servicio de Microbiología e inmunología, Instituto Nacional de Salud del Niño Breña.

^b Área de Toma de Muestra, Instituto Nacional de Salud del Niño Breña.

^c Hospital María Auxiliadora

^d Universidad Nacional Federico Villarreal

Resumen:

Introducción: La paracoccidioidomicosis es una enfermedad de alta prevalencia en Latinoamérica, asociado a actividades agrícolas, por lo que los adultos son los principales afectados; no obstante, se pueden encontrar en pacientes pediátricos, aunque raramente. **Caso Clínico:** Se presenta el caso de un niño de 5 años de edad con diagnóstico de paracoccidioidomicosis quien, además, fue diagnosticado de tuberculosis ganglionar. El paciente exhibe clínica gastrointestinal, adenopatías y síntomas constitucionales, lo que entraña un gran desafío diagnóstico, y sitúa a las pruebas microbiológicas como herramientas rápidas y dirimentes de importancia. **Conclusiones:** Se reporta el presente caso por la particularidad que el paciente, además del grupo etario, fue diagnosticado con tuberculosis ganglionar, lo que pudo solapar el diagnóstico de paracoccidioidomicosis.

Palabras clave: *Paracoccidioidomicosis, Tuberculosis, coinfección, niño* (Fuente: DeCS BIREME)

Paracoccidioidomycosis with Digestive Manifestations and Lymphadenopathy in a Pediatric Patient Diagnosed with Lymph Node Tuberculosis.

Abstract

Introduction: Paracoccidioidomycosis is a disease with high prevalence in Latin America, commonly associated with agricultural activities, making adults the primary affected group. However, it can also be found in pediatric patients, although rarely. **Case Report:** We present the case of a 5-year-old child diagnosed with paracoccidioidomycosis who was also diagnosed with lymph node tuberculosis. The patient exhibits gastrointestinal symptoms, lymphadenopathy, and constitutional symptoms, which pose a significant diagnostic challenge and highlight the importance of rapid and conclusive microbiological tests. **Conclusions:** This case is reported due to the particularity that, in addition to the age group, the patient was diagnosed with lymph node tuberculosis, which may have obscured the diagnosis of paracoccidioidomycosis.

Keywords: Paracoccidioidomycosis, Tuberculosis, coinfection, child (Source: MeSH NLM)