

Título

Mastocitoma cutáneo simulando nevo epidérmico verrucoso: reporte de caso

Autores: Felipe Velásquez Valderrama¹, Rosalía Ballona Chambergo¹, Angie Mariños Malón²

1. Dermatólogo pediatra. Servicio de Dermatología, Instituto Nacional de Salud del Niño – Breña
2. Residente de dermatología. Hospital Regional Docente de Trujillo

Resumen

La mastocitosis es un grupo heterogéneo de enfermedades cuya característica es la proliferación clonal y anormal de mastocitos en la dermis. El mastocitoma cutáneo representa el 10-30% de las mastocitosis cutánea, su carácter es autolimitado y puede presentar polimorfismo. Presentamos el caso de un paciente varón de 2 años con lesión en mano izquierda desde el nacimiento caracterizado por placa marrón de aspecto verrucoso, signo de Darier negativo. A la dermatoscopia, estructuras blanquecinas rodeadas de redes pigmentarias reticulares, en la histopatología presencia de mastocitos en dermis, inmunohistoquímica con CD117 positivo, cuyos hallazgos fueron compatibles con mastocitoma. El tratamiento instaurado fue corticoterapia tópica con buena evolución al control. El reconocimiento del mastocitoma puede ser difícil cuando el signo de Darier es negativo y cuando la lesión puede imitar otros diagnósticos. Reportamos el siguiente caso por su presentación atípica, por la necesidad de realizar un diagnóstico precoz para la prevención de episodios que puedan poner en peligro la vida del paciente y ampliar conocimientos de apoyo al diagnóstico

Palabras clave: Mastocitoma cutánea; Mastocitosis; Niños

Introducción

La mastocitosis es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de mastocitos además de la liberación de mediadores pudiendo adectar al hígado, tracto gastrointestinal, médula ósea o la piel. La presentación de la mastocitosis cutánea es heterogénea y puede ir desde las formas localizadas a las generalizadas (1). Es más común en niños donde representa el 90% de los casos. El mastocitoma representa el 10-30% de las mastocitosis cutáneas y se caracteriza por presentar una mácula, pápula o placa indurada de color amarillento o marrón con el típico signo de Darier positivo y la localización más habitual es en tronco además de presentar una evolución autolimitada por lo que el tratamiento en la mayoría de las veces es conservador (2)

Debido a su presentación atípica donde se incluye al signo de Darier negativo además de resaltar el valor de la dermatoscopia y la histopatología, presentamos el siguiente caso clínico, colocando al nevo verrucoso epidérmico como potencial diagnóstico diferencial y reforzando la necesidad de realizar un diagnóstico precoz para prevenir compromiso sistémico